

POLMASIL CORN



Polmasil Corn to mikrobiologiczny dodatek dedykowany do zakiszania kukurydzy w każdej postaci (z całych roślin, CCM, gniecione wilgotne ziarno).

Polmasil Corn szczególnie zalecamy do kiszonek z kukurydzy otwieranych i skarmianych latem. W skład Polmasilu Corn wchodzi dwa szczepy bakterii: *Enterococcus faecium* i *Lactobacillus plantarum*. Polmasil Corn wnosi na 1g zakiszanej kukurydzy 100 000 jtk bakterii fermentacji mlekowej.

Koncentracja: $1,0 \times 10^{11}$ jtk /1 g.


Opakowanie: 100g.

Dawkowanie: 100 gram/100 ton zakiszanej masy.

PH-U DABEST Dariusz Stephan, Stary Widzim 254 B, 64-200 Wolsztyn

www.dabest.pl

<https://sklepolnoprzemyslowy.abstore.pl/>



Jak stosować Polmasil Corn?

Przygotowanie roztworu roboczego: Zawartość opakowania (100 g lub 25 g) należy starannie rozpuścić w 5 litrach wody. Następnie tę mieszkę wlać do 95 litrów wody (20 litrów dla opakowania 25 g). Dozować za pomocą aplikatora w ilości 1 litr/tonę zielonki (w zależności od rodzaju aplikatora i zastosowanych dysz, ilość cieczy roboczej może być zmienna). Roztworem preparatu spryskujemy zakiszaną masę bezpośrednio w silosie lub podczas zbioru na polu.

Aplikowania roztworu na pryzmie (w silosie): Roztwór wodny inokulantu polewamy na kolejno ugniatane warstwy składowanej zielonki. Możemy zastosować do tego celu czysty opryskiwacz ręczny.

Aplikowanie roztworu na polu: Do podawania preparatów mikrobiologicznych przy zbiorze zielonki na polu służy aplikator umieszczony na sprzęcie zbierającym (sieczkarnia, prasa, przyczepa zbierająca). Ilość podawanego roztworu uzależniona jest od wydajności dysz aplikatora. Opakowanie 100 g inokulantu rozpuszczamy w takiej ilości wody, aby otrzymany płyn roboczy został zużyty do zebrania 100 ton zielonej masy spryskiwanej na polu. Podstawową zasadą takiego sposobu aplikowania jest zachowanie proporcji 100 g proszku preparatu mikrobiologicznego na 100 ton zebranej masy.