

STOSOWANIE ŚRODKA SIARKOL EXTRA 80WP

ROŚLINY SADOWNICZE

jabłoń

- mączniak jabłoni

Termin stosowania środka: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, co 7-10 dni, na krótko przed kwitnieniem i bezpośrednio po

kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 g/100m²

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

Minimalny odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 6 l/100m²

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

winorośl

- mączniak prawdziwy winorośli

Termin stosowania środka: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, co 7 -10 dni. Większą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu choroby.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

40 g/100m² (40 g/10 l wody)

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

10 - 40 g/100m² (10-40 g/ 10 l wody)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8

Minimalny odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 5 - 10 l/100m²

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOObszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest

- amerykański mączniak agrestu

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w jasnobrązowych łuskach do fazy pojawienia się pierwszych kwiatów (BBCH 51-60) oraz w początkowej fazie wzrostu owocu (BBCH 71).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100m² (50 g/10 l wody)

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 50 g/100m² (30-50 g/ 10 l wody)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 10 l/100m²

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste

borówka wysoka, malina

- mączniak prawdziwy

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, w okresie przed kwitnieniem (BBCH 41-60), po kwitnieniu - od fazy początku wzrostu owocu (BBCH 71) i po zbiorze owoców - od fazy zakończenia wzrostu pędów do fazy gdy 50% liści jest przebarwionych lub opadających (BBCH 91-95).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100m² (50 g/10 l wody)

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 50 g/100m² (30-50 g/ 10 l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni
Zalecana ilość wody: 10 l/100m²
Zalecane opryskiwania: drobnokropliste

truskawka

- mączniak prawdziwy

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, w okresie przed kwitnieniem - od początku tworzenia się pędu rozłogowego do fazy gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 41-60), po kwitnieniu - w fazie rozrostu dna kwiatowego (BBCH 71) i po zbiorze owoców - od początku tworzenia pąków w pachwinach liści do fazy gdy 50% liści jest przebarwionych lub opadających (BBCH 91-95).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100m² (50 g/10 l wody)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 50 g/100m² (30-50 g/ 10 l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni
Zalecana ilość wody: 10 l/100m²
Zalecane opryskiwania: drobnokropliste

rośliny ozdobne

- mączniak prawdziwy

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100m² (50 g/10 l wody)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 50 g/100m² (30-50 g/ 10 l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 10 l/100m²
Zalecane opryskiwania: drobnokropliste

grusza

- mączniak prawdziwy

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, na krótko przed kwitnieniem i bezpośrednio po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 g/100m² (75 g/6l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 6 l/100m²
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

brzoskwinia, morela, śliwa

- mączniak prawdziwy

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, przed kwitnieniem - od fazy pęknięcia pąków liściowych do fazy gdy pojawiają się pierwsze kwiaty otwarte (BBCH 10-60) i po zakończeniu fazy kwitnienia do końca fazy rozwoju zalążni (BBCH 69-71).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 g/100m² (15 g/5 l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 5 l/100m²
Zalecane opryskiwania: drobnokropliste

ogórek, dynia, kawon uprawiane w polu, pod osłonami i w szklarni
- mączniak

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy gdy liście są całkowicie rozwinięte do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 10-60).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 g/100m² (15 g/6 l wody)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5-7 dni

Zalecana ilość wody: 6 l/100m²

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste

pomidor, bakłażan uprawiany w polu, pod osłonami i w szklarni
- mączniak prawdziwy

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy gdy liście są całkowicie rozwinięte do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 10-60).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 g/100m² (15 g/6 l wody)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5-7 dni

Zalecana ilość wody: 6 l/100m²

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste

groch jadalny uprawiany na suche nasiona, groch jadalny uprawiany na zielone nasiona
- mączniak prawdziwy

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści do początku fazy gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 10-60).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 g/100m² (15 g/6 l wody)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 6 l/100m²

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste

marchew, pietruszka
- mączniak prawdziwy

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo począwszy od fazy gdy korzenie zaczynają się poszerzać (BBCH >41) lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 15 g/100m² (15 g/4-6 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5-7 dni

Zalecana ilość wody: 4-6 l/100m²

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste

rumianek, lubczyk uprawiane w polu, pod osłonami i w szklarni
- mączniak prawdziwy

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/100m² (30 g/6 l wody)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Zalecana ilość wody: 6 l/100m²

Zalecane opryskiwania: drobnokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA

Środek stosować przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje

czynne z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.

Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać

przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą.

Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz mechanicznie wymieszać.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.