

SWITCH 62,5WG



Switch 62,5 WG jest preparatem niszczącym grzyby, a także zapobiega powstawaniu chorób grzybowych. Ma wysoką skuteczność w szerokim zakresie stosowania. Może być używany na roślinach sadowniczych, warzywnych oraz ozdobnych.

Zwalcza m.in. Szarą pleśń, Zgniliznę brunatną, Zgniliznę gorzką, Antraknozę, zapobiega infekcjom wtórnych patogenów, przeciwdziała zamieraniu pędów.

Może być stosowany na: czereśni, wiśni, gruszy, śliwie, moreli, brzoskwini, nektarynce, winorośli, porzeczkach, borówce, truskawce, malinie, jabłoni, pomidorze, ziołach, fasoli, grochu, cebuli, roślinach ozdobnych i drzewach owocowych.

Środek w postaci granulatu należy mieszać z wodą zgodnie z instrukcją stosowania. Utworzy się zawiesina wodna, którą należy rozpylić na roślinach przy pomocy opryskiwacza ręcznego. Preparat działa kontaktowo i włąębnie.

Wybrane zastosowania		
Czereśnia	Brunatna zgnilizna	6-10g w 6-15l/100m ²
Wiśnia	Brunatna zgnilizna	6-10g w 6-15l/100m ²
Grusza	Brunatna zgnilizna	7,5-10g w 6-15l/100m ²
Śliwa	Brunatna zgnilizna	6-10g w 6-15l/100m ²
Morela, Brzoskwinia, Nektarynka	Brunatna zgnilizna	6-10g w 6-15l/100m ²
Winorośl	Szara pleśń	12g w 4-10l/100m ²
Porzeczka czarna, czerwona	Szara pleśń, zamieranie pędów	8-10g w 7-10l/100m ²
Borówka amerykańska	Szara pleśń, antraknoza	10g w 5-20l/100m ²
Truskawka	Szara pleśń, antraknoza	8g w 6-8l/100m ²
Jabłoń	Gorzka zgnilizna, Szara pleśń	7,5g w 6l/100m ²
Zioła (uprawa w gruncie, pod osłonami i w szklarni)	Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	6g w 3-10l/100m ²
Fasola szparagowa	Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza fasoli	8-10g w 7l/100m ²
Pomidor (w uprawie szklarniowej)	Szara pleśń	10g w 10l/100m ²
Cebula	Szara pleśń, zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa	10g w 3-10l/100m ²
Rośliny ozdobne (Uprawiane w	Szara pleśń, zapobieganie infekcjom	10g w 5-

gruncie, pod osłonami i w szklarniach)	wtórnych patogenów, zamieranie pędów i kwiatów powodowanych przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych	12l/100m ²
Szkółki drzew ozdobnych i owocowych	Szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów	10g w 5-12l/100m ²

Cechy środka

- Dawka podstawowa
- 6-12g w 10l/100m²
- Działa na
- Choroby grzybowe: Szarą pleśń, zgniliznę brunatną, zgniliznę gorzką, zgniliznę twardzikową, zamieranie pędów, antraknozę i inne.
- Rodzaj środka
- Grzybobójczy
- Zawartość substancji biologicznie czynnej
- Cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn)-35,7%, fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) - 25%