



ŚRODEK POMOCNICZY ADIUWANT DO STOSOWANIA W ROLNICTWIE I OGRODNICTWIE

SUBSTANCJA AKTYWNA

ALKOHOL ETOKSYLOWANY 8,15% wag.

FORMULACJA

KONCENTRAT ROZPUSZCZALNY (SL)

ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA

H315 Działa drażniąco na skórę. **H319** Działa drażniąco na oczy. **H412** Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. **P273** Unikać uwolnienia do środowiska. **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. **P305 + P351 + P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P337 + P313** W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. **P333 + P313** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. **P362 + P364** Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/narodowymi/międzynarodowymi.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.



UWAGA

PRODUCENT I DOSTAWCA



BANKA STRAAT 75
9715CJ GRONINGEN • HOLLANDIA
TEL.: +31 50 820 04 11
WWW.OROAGRI.COM

ZAWARTOŚĆ

1 L

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WETCIT™ jest środkiem pomocniczym przeznaczonym do stosowania na liść łącznie ze wszelkimi zatwierdzonymi nawozami agrochemicznymi i/lub nawozami dolistnymi. Środkiem **WETCIT** można opryskiwać wszystkie rośliny w zgodny z wymogami prawnymi sposób obowiązujący dla agrochemicznego partnera do mieszanek. **WETCIT** to środek pomocniczy zawierający wyjątkowe połączenie składników powodujących znaczące obniżenie napięcia powierzchniowego wody. **WETCIT** zapewnia jednolitą wielkość kropeł. **WETCIT** poprawia rozsmieszczenie i rozpraszanie oraz zwiększa zasięg opryskiwaczy w trudno dostępnych miejscach, zwłaszcza w przypadku hydrofobowych powierzchni roślin oraz roślin o gęstym ulistnieniu.

WETCIT wzmacnia „efekt uderzeniowy” (szybkie działanie) pestycydów, poprawiając przylganie do woskopodobnych powłok owadów i zewnętrznych hydrofobowych struktur grzybow. **WETCIT** nie powoduje zmniejszenia intensywności fotosyntezy ani transpiracji, co często jest skutkiem aplikowania olejów mineralnych i roślinnych. Działanie **WETCIT** nie jest zależne od pH mieszaniny, jak również **WETCIT** nie ma wpływu na pH mieszaniny. **WETCIT** pomaga rozprzecznić wodę na powierzchni liści do 6 dni po zastosowaniu, dzięki czemu zmniejsza się ilość wody na powierzchni liści.

ZASTOSOWANIE

Sposób podawania: oprysk liści. Odpowiedni do różnych technik podawania (oprysk, rozpylanie itd.).

ROŚLINY	PARTNERZY DO MIESZANEK	MAKSYMALNA LICZBA DAWEK	OSTATNIA DAWKA
WSZYSTKIE ROŚLINY	- Wszystkie zatwierdzone środki agrochemiczne - Nawozy dolistne	Należy przestrzegać zwykłego sposobu mieszania obowiązującego dla partnera do mieszanek.	Należy przestrzegać zwykłego sposobu mieszania obowiązującego dla partnera do mieszanek.

ZALECENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA CIECZY UŻYTKOWEJ

Podczas mieszania **WETCIT** z innym środkiem należy przestrzegać zwykłego sposobu mieszania obowiązującego dla tego środka. **WETCIT** należy dodać do zbiornika na końcu, kiedy zbiornik będzie wypełniony co najmniej w dwóch trzecich objętości. Aby uzyskać najlepsze skutki, ciecz użytkową należy zużyć w przeciągu 24 godzin od sporządzenia.

Zastosowanie środka przeciw plienieniu może okazać się potrzebne, jeśli zbiornik jest napowietrzony. Nie ma to wpływu na działanie cieczy.

Przed pierwszym użyciem **WETCIT** należy upewnić się, że wszystkie urządzenia do opryskiwania zostały dokładnie wyczyszczone, ponieważ produkt może spowodować uwolnienie się pozostałości chemicznych w zbiornikach opryskiwaczy oraz w urządzeniach do opryskiwania. Podczas pierwszego podawania produktu należy częściej kontrolować stan filtrów.

DAWKOWANIE

ROŚLINY	ZATWIERDZONE AGROCHEMICZNE PARTNERY DO MIESZANEK	STĘŻENIE WETCIT W MIESZANCE DO OPRYSKU
WSZYSTKIE ROŚLINY	HERBICYD	0.1 % do 1.0 %
	DEFOLIANT	0.1 % do 0.25 %
	INSEKTYCYDY, MITICYDY, FUNGICYDY	0.1 % do 0.3 %
	REGULATORY WZROSTU ROŚLIN	0.05 % do 0.1 %
	NAWOZY DOLISTNE	0.1 % do 0.3 %

WETCIT MOŻE OGRANICZYĆ ZNOSZENIE CIECZY UŻYTKOWEJ W PRZYPADKU, GDY STANOWI TO PROBLEM.

KOMPATYBILNOŚĆ

WETCIT jest kompatybilny z większością środków agrochemicznych. Na kompatybilność mogą jednak wpłynąć składniki znajdujące się w mieszaninie zbiornikowej. Dlatego przed opryskaniem roślin należy przeprowadzić test mieszanki na niewielkiej powierzchni.

FITOTOKSYCZNOŚĆ

Należy podawać w godzinach porannych lub wieczornych (unikaj wysokich temperatur). Należy zaprzestać opryskiwania, zanim mieszanina zacznie spływać po liściach. Jest to szczególnie istotne w okresie owocowania owoców pestkowych, wiśni, winorośli i innych delikatnych roślin. Ze względu na wahania w preparatach zawierających miedź i siarkę usilnie zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilności. Należy zachować ostrożność przy mieszaniu produktu z formulacjami EC oraz środkami zawierającymi miedź i/lub chloropirifos przy zastosowaniu na roślinach, które są wrażliwe na te składniki.

Podczas mieszania różnych substancji chemicznych zaleca się w razie potrzeby stosowanie najmniejszych dawek uwzględnionych w specyfikacji.

W przypadku delikatnych roślin (np. winorośli) należy przeprowadzić test na niewielkiej powierzchni przed opryskaniem roślin. Należy także zastosować najmniejszą zalecaną dawkę.

SKŁADOWANIE

Produkt należy przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamkniętym i oznaczonym. Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chronić przed światłem słonecznym, wysoką temperaturą i wilgocią. Unikać temperatur poniżej 0°C.