



DOLISTNY NAWÓZ KRZEMOWO-WAPNIOWY



SmartSil SC – dolistny nawóz o innowacyjnym połączeniu krzemu, wapnia oraz PureKlin (SmartComplex). Zbilansowany skład oraz odpowiednio dobrane połączenie składników pokarmowych zapewniają roślinie właściwe odżywienie oraz wzrost odporności. Systematyczne stosowanie SmartSil® SC umożliwia uzyskanie plonów o najwyższych parametrach jakościowych, a nowoczesna formuła gwarantuje wysoką wydajność i efektywność produktu.




INNOWACYJNE POŁĄCZENIE KRZEMU, WAPNIA I PUREKLIN

Skład (w/w):

Tlenek wapnia CaO	17%
Dwutlenek krzemu SiO ₂	10%
Trójtlenek żelaza Fe ₂ O ₃	0,8%
Tlenek potasu K ₂ O	0,7%
Tlenek magnezu MgO	0,5%



CO TO JEST SMARTCOMPLEX





KORZYŚCI UPRAWY SADOWNICZE

- Zwiększa jędrność, zawartość cukrów i masę owoców
- Poprawia dorastanie owoców
- Zmniejsza podatność owoców na pękanie
- Wydłuża trwałość pozbiorną owoców
- Podnosi odporność roślin na choroby grzybowe i szkodniki
- Regeneruje rośliny po stresie herbicydowym
- Zwiększa odporność roślin na suszę



KORZYŚCI UPRAWY WARZYNNE

- Zwiększa jędrność, zawartość suchej masy, cukrów i karotenu
- Poprawia dorastanie główek, róż, owoców, korzeni
- Wydłuża trwałość pozbiorną warzyw
- Zwiększa odporność roślin na uszkodzenia mechaniczne
- Podnosi odporność roślin na choroby grzybowe i szkodniki
- Regeneruje rośliny po stresie herbicydowym
- Zwiększa odporność roślin na suszę



KORZYŚCI UPRAWY ROLNICZE

- Poprawia przetrzymywanie ozimin i ich wigor na wiosnę
- Zwiększa polaryzację buraka cukrowego
- Zwiększa zaolejenie rzepaku
- Zwiększa zawartość suchej masy i skrobi w ziemniaku
- Poprawia początkowy wigor kukurydzy
- Podnosi odporność roślin na choroby grzybowe i szkodniki
- Regeneruje rośliny po stresie herbicydowym
- Zwiększa odporność roślin na suszę





PLONY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Uprawa Dawka l/ha* Termin

UPRAWY SADOWNICZE

Jabłoń, grusza	1,5 – 2	8 – 10 aplikacji: mysie ucho (1 apl.), różowy / biały pąk (1 apl.), k. kwitnienia (1 apl.), wzrost zawiązków (2 – 3 apl.), wzrost owoców (3 – 4 apl.)
Wiśnia, czereśnia, śliwa	1,5 – 2	5 aplikacji: k. kwitnienia (1 apl.), wzrost zawiązków (2 apl.), wzrost owoców (2 apl.)
Borówka, malina, porzeczka	1,5 – 2	6 – 8 aplikacji: rozwój kwiatostanu (2 apl.), wzrost zawiązków (2 – 3 apl.), wzrost owoców (2 – 3 apl.)
Truskawka	1,5 – 2	4 – 6 aplikacji: rozwój kwiatostanu (1 apl.), wzrost zawiązków (2 – 3 apl.), wzrost owoców (1 – 2 apl.)

UPRAWY WARZYWNE

Kalafior, brokuł, kapusta	1,5 – 2	3 aplikacje: 7 – 10 dni po wysadzeniu rozsady (1 apl.), wykształcanie i dorastanie róż / zawiązywanie pąków lub główki (2 apl.)
Cebula	1,5 – 2	2 aplikacje: 4 – 6 liści właściwych (1 apl.), rozwój cebuli (1 apl.)
Burak ćwikłowy, marchew, pietruszka, seler	1,5 – 2	2 aplikacje: 4 – 6 liści właściwych (1 apl.), od początku przrastania korzenia (1 apl.)
Salata	1,5 – 2	2 aplikacje: 7 dni po wysadzeniu rozsady (1 apl.), zawiązywanie główki (1 apl.)
Pomidor, ogórek, papryka	1,5 – 2	4 aplikacje: faza 6 – 8 liści właściwych / 10 – 14 dni po wysadzeniu rozsady (1 apl.), po wytworzeniu pąków kwiatowych (1 apl.), wiązanie i wzrost owoców (2 apl.)
Fasola, groch	1,5 – 2	2 aplikacje: 4 – 6 liści właściwych (1 apl.), 8 – 10 liści właściwych (1 apl.)

UPRAWY ROLNICZE

Rzepak ozimy	1 – 1,5	3 aplikacje: jesienią – 6 – 8 liści właściwych (1 apl.), wiosną – wzrost pędu głównego (1 apl.), zielony pąk, do początku kwitnienia (1 apl.)
Zboża ozime	1 – 1,5	2 aplikacje: jesienią – 3 – 5 liści właściwych (1 apl.), wiosną – koniec krzewienia do fazy II kolanka (1 apl.)
Kukurydza	1 – 1,5	1 aplikacja: 4 – 8 liści właściwych
Ziemniak	1 – 1,5	3 aplikacje: 8 – 10 liści właściwych (1 apl.), liście zakrywają 70 – 90% międzyrzędzi (1 apl.), początek kwitnienia (1 apl.)
Burak cukrowy	1 – 1,5	2 aplikacje: 4 – 6 rozwiniętych liści (1 apl.), liście zakrywają 10 – 30% międzyrzędzi (1 apl.)

* Dawka i termin aplikacji powinny być dostosowane do stanu uprawy i warunków lokalnych, w konsultacji z Doradcą Technicznym NATURALCROP POLAND.

W celu regeneracji i detoksykacji roślin po **stresie herbicydowym** należy wykonać dodatkowe zabiegi co 5 – 7 dni.

Celem wzmocnienia działania SmartSil® SC zalecany jest dodatek enzymatycznego koncentratu L-aminokwasów – NaturalCrop®SL – w dawce 1 l/ha do każdego zabiegu. Polipeptydy i aminokwasy, zawarte w NaturalCrop®SL, stabilizują mieszaninę oraz tworzą na liściu powłokę zapobiegającą parowaniu i wysychaniu cieczy, w efekcie składniki SmartSil® SC są lepiej pobierane przez rośliny. Ponadto, SmartSil® SC intensyfikując procesy metaboliczne roślin powoduje zwiększenie ich zapotrzebowania na azot, którego doskonałym źródłem są aminokwasy NaturalCrop®SL.

Podmiot wprowadzający:
NaturalCrop Poland Sp. z o.o.
Aleja KEN 57/2; 02-797 Warszawa
tel. (+48) 22 522 90 80
www.naturalcrop.com



/NaturalCropPoland

Dystrybutor / Doradca NaturalCrop