

Virkon żółty

Naturan

200gram



VIRKON jest proszkowym, wieloskładnikowym preparatem. Zawiera mieszaninę związków powierzchniowo czynnych, substancji utleniających, kwasów organicznych, nieorganicznych układów buforujących oraz dodatek substancji stabilizujących. Substancją czynną jest bis (siarczan) bis (nadtlenomonosiarczan) pentapotasu. W roztworze użytkowym ma barwę różową, charakteryzuje się właściwościami pieniącymi.

ZAKRES STOSOWANIA

VIRKON jest stosowany wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność profilaktyki lub opanowania szerzenia się zakażeń bakteryjnych, grzybiczych oraz wirusowych. Ze względu na szeroki zakres działania biobójczego w stosunku do drobnoustrojów chorobotwórczych i powodujących psucie żywności preparat jest dopuszczony do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz do dezynfekcji jaj przeznaczonych do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa. VIRKON posiada właściwości dezynfekująco-myjące i zalecany jest do dezynfekcji powierzchni, sprzętów, maszyn i urządzeń wykonanych z metali, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Szczególnie jest zalecany w przemyśle spożywczym, handlu, gastronomii, zakładach zbiorowego żywienia oraz placówkach użyteczności publicznej do dezynfekcji:

- linii technologicznych, sprzętu i urządzeń produkcyjnych
- urządzeń chłodniczych
- blatów kuchennych, sztućców, talerzy i naczyń
- powierzchni podłóg i ścian
- zgarniaków, szczotek, mioteł, pojemników na odpady
- urządzeń sanitarnych
- środków transportu. VIRKON używany jest w zamkniętych i otwartych placówkach służby zdrowia (szpitalach, przychodniach, sanatoriach), stacjach krwiodawstwa oraz przez producentów szczepionek i przemysł farmaceutyczny. VIRKON stosowany jest także w rolnictwie.

Sposób użycia

Preparat należy stosować na powierzchnie wstępnie oczyszczone i umyte, zarówno do przeprowadzenia dezynfekcji profilaktycznej jak i w warunkach zagrożenia epizootycznego. Preparat może być наносzony na odkażane powierzchnie poprzez mycie, wycieranie, oprysk lub drobnokroplisty oprysk z użyciem aparatów ciśnieniowych.

Dezynfekcja profilaktyczna

Należy stosować roztwór 0,5-1,0% (0,5-1 kg preparatu rozpuścić w 100 l letniej wody, 5,0-10,0 g w 1 l letniej wody). Czas działania 30-60 minut.

Dezynfekcja w ogniskach chorób zakaźnych

Należy stosować roztwór 2,0 %, 300 ml/m², (2,0 kg na 100 l letniej wody lub 20,0 g na 1 l). Czas działania 60 minut.