

NAWÓZ WE ROZTWÓR NAWOZOWY NP 3-30 (Typ B.2.1.)

Podmiot wprowadzający nawóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: NaturalCrop Poland Sp. z o.o. | Aleja KEN 57/2 | 02-797 Warszawa | tel. (+48) 22 522 90 80 | www.naturalcrop.com

Producent: Biolchim S.p.A. | Via S. Carlo, 2130 | 40059 Medicina (BO), Italia | tel. (+39) 051 6971811 | fax (+39) 051 852884 | biolchim@biolchim.it | www.biolchim.it

Phostart Zn

ROZTWÓR NAWOZOWY NP 3-30 Z CYNKIEM (Zn)

Skład (m/m):	(m/m)	(g/l)
Azot całkowity (N)	3%	46,2
Azot azotanowy (N)	1,5%	23,1
Azot amonowy (N)	1,5%	23,1
Pięciotlenek fosforu (P ₂ O ₅) rozpuszczalny w wodzie	30%	462
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie	7%	107,8

Właściwości fizyko-chemiczne:

Postać – płynna

Wysoka gęstość – 1,54 kg/dm³

Opis produktu:

- Unikalna formuła o wysokiej zawartości fosforu i cynku z efektem startowym.
- Dedykowany do stosowania w pierwszym etapie uprawy w celu stymulacji rozwoju systemu korzeniowego.
- Zalecany szczególnie w sytuacjach utrudnionego pobierania fosforu z gleby z powodu niskiej temperatury i/lub wysokiego pH.
- Dostosowany do upraw o wysokich wymaganiach w stosunku do cynku.

Zakres stosowania: Stosować dolistnie i/lub przez systemy do fertygacji w uprawach polowych i pod osłonami, rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

Dawka, sposób i termin zastosowania:

STOSOWANIE DOLISTNE:

Kukurydza, rzepak, zboża – 1-2 l/ha

NAWOŻENIE ZLOKALIZOWANE Z SIEWEM:

Aplikować produkt w pobliżu nasion lub stosować herbicydami przedwschodowymi w dawce 20 l/ha.

FERTYGACJA:

- Drzewa owocowe: wiosną, po rozpoczęciu wegetacji – 20 l/ha
- Warzywa pod osłonami: przy wysadzeniu i przed kwitnieniem – 2 l/1000 m²
- Warzywa polowe przy wysadzeniu i przed kwitnieniem – 20 l/ha

W celu uzyskania szczegółowej porady dotyczącej stosowania produktu w określonych warunkach uprawowych proszę skonsultować się z działem technicznym NaturalCrop Poland Sp. z o.o. Produkt można mieszać ze wszystkimi typowymi preparatami (w tym z roztworem saletrzano-mocznikowym), z wyjątkiem produktów zawierających wapń. Przed zmieszaniem w opryskiwaczu, w celu sprawdzenia kompatybilności zaleca się wykonać prosty test mieszalności. Biolchim S.p.A. odpowiada tylko za skład produktu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem produktu.

Sposób przygotowania cieczy użytkowej do oprysku: Zalecaną dawkę nawozu należy dobrze rozpuścić w wodzie. Przygotowanym roztworem opryskiwać rośliny zgodnie z zamieszczonymi zaleceniami.

Środki ostrożności:

W razie przypadkowego rozlania należy usunąć wyciek, unikać zanieczyszczenia wody. W razie konieczności, usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sposób przechowywania nawozu:

Przechowywać w zakresie temperatur 5°C – 25°C, z dala od ognia, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Unikać przedłużonej ekspozycji na niskie temperatury. Przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pojemniki z produktem ustawiać prosto, w bezpiecznej pozycji w celu uniknięcia przewrócenia.

Termin przydatności: 5 lat od daty produkcji.

Opakowania:

<i>Opakowanie jednostkowe</i>	<i>Opakowanie zbiorcze</i>	<i>Paletyzacja</i>
20 l (30,8 kg)		
200 l (308 kg)		
1000 l (1540 kg)		

PŁYNNY NAWÓZ Z EFEKTEM STARTOWYM